



Biamino[®]

NAWÓZ ORGANICZNY AZOTOWY
ZAWIERAJĄCY WYŁĄCZNIE AMINOKWASY
POCHODZENIA ROŚLINNEGO

PLANT



AGRO




WARZYWA



SADY

Zawiera
L-aminokwasy
roślinne najlepiej
wykorzystywane
przez rośliny



IDEALNY
DO UPRAW:
ROLNICZYCH
SADOWNICZYCH
WARZYWNYCH
KWIATOWYCH





PŁYNNY WYCIĄG POCHODZENIA ROŚLINNEGO UZYSKIWANY Z OWOCÓW I ZBÓŻ



PŁYNNY NAWÓZ ORGANICZNY AZOTOWY

Biamino Plant to płynny nawóz organiczny bogaty w materię organiczną i wolne L-aminokwasy pochodzenia roślinnego, który podlega natychmiastowej absorpcji zaraz po aplikacji dolistnej. Zalecany do stosowania, aby uchronić rośliny przed negatywnymi skutkami czynników stresowych (susza, przymrozki, gradobicie, choroby). Możliwy do stosowania we wszystkich gatunkach roślin uprawnych (rolniczych, warzywnych, sadowniczych).

- Szybko regeneruje rośliny po przebytych stresie
- Skuteczna stymulacja i zwiększenie plonowania roślin
- Zawiera 4% glicyny-betainy, dzięki której roślina pokonuje szybciej stres
- Zwiększa wchłanianie stosowanych agrochemikaliów
- Działa stymulująco i antystresowo



Dostępny w opakowaniach
o pojemności netto:

1L, 5L, 15L

POLSIL®
BIOPREPARATY

Biuro Obsługi Klienta w Toruniu
ul. Okólna 128/7
87-100 Toruń

tel. 508 564 817, tel./fax 56 654 84 27
polsil@polsil.pl

Woj. lubelskie i podlaskie: tel. 508 564 849
Woj. wielkopolskie i lubuskie: tel. 530 152 246
Woj. kujawsko-pomorskie: tel. 502 790 856
Woj. mazowieckie i łódzkie: tel. 509 849 868

www.polsil.pl

ZALECENIA UPRAWOWE

Wstrząsnąć przed użyciem.

Uprawy rolnicze	Wiosną, po ruszeniu wegetacji lub po pełnych wschodach roślin. Podczas wzrostu wegetatywnego.	1,5-2 l/ha
Drzewa owocowe	Przed kwitnieniem. Podczas kwitnienia, przed i po wystąpieniu przymrozków. W czasie wzrostu zawiązków	2-3 l/ha
Jagodowe	Przed kwitnieniem. Podczas kwitnienia, przed i po wystąpieniu przymrozków. W czasie wzrostu zawiązków.	1,5-2,5 l/ha
Warzywa polowe	Po przesadzeniu lub po pełnych wschodach roślin. Kolejne zabiegi co 15-20 dni.	1,5-2 l/ha
Warzywa pod osłonami	Po przesadzeniu lub po pełnych wschodach roślin. Podczas wzrostu wegetatywnego.	250-350 ml/100L wody
Rośliny ozdobne	Podczas wzrostu wegetatywnego co 15-20 dni.	250-400 ml/100L wody
Fertygacja	Rozprowadzać produkt o koncentracji 0,2%-0,3%	

W okresie kwitnienia przed i po wystąpieniu stresu Biamino Plant stosować osobno w górnej zalecanej dawce. W dawce 1L/ha można stosować podczas całego okresu wegetacji roślin, aby zwiększyć skuteczność działania środków ochrony roślin, chlorku wapnia i nawozów dolistnych.

Ostrzeżenie: Unikać oprysków podczas najgorętszych godzin dnia.

SKŁAD

Składnik pokarmowy	w/w	w/v
Azot (N) całkowity	5%	6,25%
Azot (N) organiczny	5%	6,25%
Węgiel (C) organiczny	16%	20%
Całkowita ilość aminokwasów	20%	25%
Aminokwasy wolne	12%	15%

% w/w (równoważy % w/v przy 20°C)

👍 Polub nas!



facebook.com/polsil.biopreparaty